



Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej.

1. Na 2-3 dni przed badaniem, po każdym posiłku zastosować leki:
Espumisan lub Espucicot (dostępne w aptekach bez recepty).
2. W dniu poprzedzającym badanie nie powinno się jeść potraw ciężkostrawnych, wzdymających oraz pić napojów gazowanych, a ostatni posiłek spożyć nie później niż o godz. 19:00. Można zastosować lek przeczyszczający.
3. W dniu badania należy przyjąć 2 kapsułki Espumisanu, zadbać o wypróżnienie. Zgłosić się do pracowni USG na czczo – nie należy także pić żadnych płynów (np. woda, kawa, herbata, piwo).
4. Jeżeli badanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, należy spożyć lekkie śniadanie (np. bułka z masłem + gorzka herbata). Od posiłku do czasu badania powinno upłynąć minimum 6 godzin.
5. Pacjenci stale przyjmujący leki np. obniżające ciśnienie tętnicze powinni zażyć lek popijając niewielką ilością wody.
6. Pacjenci chorzy na cukrzycę w dniu badania powinni odłożyć zastosowanie leków przeciwcukrzycowych i insuliny do czasu przewidywanego posiłku.
7. Jeżeli planowane jest wykonanie badania USG układu moczowego z oceną pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego, należy zgłosić się do pracowni USG z pełnym pęcherzem moczowym (wypić 1-1,5 litra płynu niegazowanego na 1-2 godziny przed badaniem).